

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول

التمرين الأول : (4 نقط)

يمثل الجدول الآتي تطور إنتاج معمل الإسمنت خلال 6 سنوات من 2000 إلى 2005 .

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج بالمليون طن y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6

1- مثل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد و متجانس حيث وحدة الأطوال $2cm$.

2 - عين إحدائتي النقطة المتوسطة G .

3 - أ - بين أن a معامل توجيه مستقيم الانحدار (D) مدورا إلى 10^{-2} هو $a = 0,37$.
علما أن G نقطة من (D) . عين معادلة مختصرة للمستقيم (D) .

ب- من أهداف المعمل الوصول إلى إنتاج 7,3 مليون طن في سنة 2009 .
بين باستعمال التعديل الخطي السابق إذا كان هذا الهدف يمكن أن يتحقق ؟

التمرين الثاني (4 نقط)

$$\begin{cases} u_0 = \alpha & ; (\alpha \in \mathbb{R}) \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9} & ; (n \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

(u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي :

(1) برهن بالتراجع أنه في حالة $\alpha = -\frac{8}{3}$ تكون المتتالية (u_n) ثابتة .

(2) في كل مايلي $\alpha = 2$ ، و نعرف المتتالية العددية (v_n) كما يلي : $v_n = u_n + \frac{8}{3}$

(أ) احسب u_1 ، u_2 .

(ب) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q و حدها الأول v_0 .

(ج) أكتب عبارة u_n بدلالة n . و احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

التمرين الثالث : (4 نقط)

يحتوي كيس على 7 كرات منها 3 بيضاء تحمل الأرقام -2 ، 1 ، 2 ، و أربع حمراء تحمل الأرقام 2 ، 2 ، 1 ، 1 .

(1) نسحب كرة واحدة من الكيس .

(أ) ما احتمال الحصول على كرة تحمل الرقم 1 .

(ب) إذا كانت الكرة المسحوبة تحمل الرقم 1 فما هو احتمال أن يكون لونها أحمرًا .

- (2) نسحب على التوالي كرتين من الكيس دون إرجاع.
 (أ) ما احتمال الحصول على كرتين تحمل كل منها رقما فرديا.
 (ب) ما احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون.
 (ج) ما احتمال أن يكون مجموع الرقمين الظاهريين 3 .

التمرين الرابع : (08 نقط)

لتكن f دالة عددية قابلة للإشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها .لها جدول التغيرات التالي :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

$-\infty \rightarrow 1 \rightarrow -\infty$ $+\infty \rightarrow 3 \rightarrow +\infty$

تكتب عبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ حيث c, b, a أعداد حقيقية.

(1) احسب $f'(x)$.

(2) اعتمادا على جدول تغيرات الدالة f :

أ- عين الأعداد الحقيقية c, b, a .

ب- عين $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و فسر النتيجة بيانيا.

ج- قارن بين صورتَي العددين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بالدالة f معللا إجابتك.

(3) نأخذ فيما يلي : $a=1$ ؛ $b=1$ ؛ $c=\frac{1}{4}$ و ليكن (C) المنحنى البياني الممثل لتغيرات الدالة f في معلم متعامد

و متجانس.

(أ) بين انه عندما يؤول x الى $(+\infty)$ أو $(-\infty)$ فان المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) معادلته : $y = x + 1$.

(ب) لدرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة الى المستقيم (Δ) .

(ج) اثبت ان النقطة $\omega(1,2)$ مركز تناظر للمنحنى (C) .

(د) عين نقط تقاطع المنحنى (C) مع حامل محور الفواصل

(4) λ عدد حقيقي ، عين بيانيا ، حسب قيم λ عدد حلول المعادلة $f(x) = |\lambda|$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول (5 نقاط):

المتتالية العددية (u_n) معرفة كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 1$.

1. احسب u_1 ، u_2 و u_3 .

2. أ. اثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geq -2$

ب. جد اتجاه تغير المتتالية (u_n) . ماذا تستنتج ؟

3. (v_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = u_n + 2$.

أ. بين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية .

ب. عبر بدلالة n عن الحد العام v_n ثم u_n .

ج. احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

د . احسب، بدلالة n ، المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

التمرين الثاني (5 نقاط):

يحتوي كيس على 10 قريصات لا يمكن التفريق بينها باللمس ، من بينها 6 حمراء اللون تحمل

الأرقام 1 ، 2 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، و البقية بيضاء اللون تحمل الأرقام 1 ، 3 ، 5 ، 5 .

1 (نسحب ثلاثة قريصات من هذا الكيس واحدة تلو الأخرى دون إرجاع .

المطلوب حساب :

أ - احتمال الحصول على ثلاثة قريصات من نفس اللون .

ب- احتمال الحصول على ثلاثة قريصات بلونين مختلفين.

ج - احتمال الحصول على ثلاثة قريصات تحمل ثلاثة أرقام مجموعها 15 .

د - احتمال الحصول على ثلاثة قريصات مجموعها 15 علما أنها من نفس اللون.

التمرين الثالث (5 نقاط):

الدالة كثير الحدود P معرفة على \mathbb{R} كما يلي : $P(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + \frac{1}{2}$

1. شكل جدول تغيرات الدالة P على \mathbb{R} .

2. بين أن المعادلة $P(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\frac{1}{2}; 0[$.

3. استنتج إشارة $P(x)$ على \mathbb{R} .

4. الدالة العددية G معرفة على \mathbb{R} كما يلي : $G(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + \frac{1}{2}x$

عين اتجاه تغير الدالة G على \mathbb{R} (لا يطلب حساب $G(\alpha)$).

التمرين الرابع (5 نقاط):

الجدول التالي يمثل تطور نسبة البطالة في بلد بين السنوات 1970 و 2005.

السنة a_i	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
رتبة السنة $x_i = a_i - 1970$	0	5	10	15	20	25	30	35
النسبة المئوية y_i	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	2.2	2.5	2

1. مثل بيانيا سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.

(1 cm لكل 5 سنوات على محور الفواصل و 1 cm لكل 0.5% على محور الترتيب)

2. جد إحداثيتي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علمها.

3. أ. بين أن المعادلة المختصرة لـ (Δ) مستقيم الإنحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة هي:

$$y = 0,03x + 1,19 \text{ ثم ارسمه.}$$

ب. ما هي نسبة البطالة المتوقعة في هذا البلد سنة 2009؟

ج. ابتداء من أي سنة تصبح النسبة المتوقعة للبطالة أكبر من 3%؟

العلامة		عناصر الإجابة	الموضوع الأول	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة			
04	0,5	$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5$	تمرين 1 (04 نقاط) 1 - تمثيل سحابة النقط	احصاء
	0,5	$\bar{y} = \frac{3,8+4+4,5+5,2+5,6}{6} = 4,65$	2 -	
	0,5		إذن $G(3,5, 4,65)$	
			$a = \frac{\left(\frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i y_i\right) - \bar{x}\bar{y}}{\frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2} (1 - 3)$	
	2×0,25	$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = 17,5$ و $\sum_{i=1}^6 x_i y_i = 104,1$		
	0,5		و منه $a = 0,37$	
	0,5		$b = 3,36$ و منه $\bar{y} = a\bar{x} + b$	
			$(D): y = 0,37x + 3,36$	
	0,25		ب) رتبة 2009 هي 10	
	0,5		من اجل $x = 10$ يكون $y = 7,06$	
0,25		الهدف لا يمكن أن يتحقق ملاحظة : في حالة القراءة البيانية تقبل الإجابة بين 6,8 و 7,2		
04 نقاط	0,5×2		التمرين الثاني : (04 نقط)	المتاليات
	0,25×2		1) البرهان بالتراجع :	
			2) (أ) $u_2 = \frac{-16}{27}$ ، $u_1 = \frac{4}{9}$	
	0,25×2+0,5		ب) $v_0 = \frac{14}{3}$ ، $q = \frac{2}{3}$ ؛ $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$	
	0,5×2		ج) $u_n = \frac{14}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{8}{3}$ و منه $v_n = \frac{14}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n$	
0,5		$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{8}{3}$		
0,5	0,5		التمرين الثالث 04 نقاط	احتمالات
	0,5		1) أ) احتمال الحصول على كرة تحمل الرقم 1 هو : $P(A) = \frac{3}{7}$	
	0,75		ب) $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ الحادثة الحصول على كرة حمراء	
			$P_A(B) = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{1}{2}}{\frac{3}{7}} = \frac{2}{3}$	

محاو الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة											
		مجزأة	المجموع										
04	(2) (أ) احتمال الحصول على كرتين تحمل رقما فرديا : $P(C) = \frac{1}{7}$	0,5	04										
	(ب) احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون : $P(D) = \frac{3}{7}$	0,5											
	(ج) احتمال أن يكون مجموع الرقمين الظاهرين 3 : $P(E) = \frac{3}{14}$	0,5											
الدوال العددية	التمرين الرابع : 08 نقاط	0,5	08										
	(1) $f'(x) = a - \frac{c}{(x-1)^2}$	0,25×3											
	(2) (أ) $\begin{cases} a-4c=0 \\ \frac{1}{2}a+b-2c=1 \\ \frac{3}{2}a+b+2c=3 \end{cases}$	0,25×3											
	$a=1, b=1, c=\frac{1}{4}$	0,25×3											
	(ب) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$	0,25×2											
	المستقيم $x=1$ مقارب للمنحنى الممثل للدالة f	0,25											
	(ج) $f\left(\frac{1}{2}\right) > f\left(\frac{3}{4}\right)$ لأن $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ و f متناقصة على $\left] \frac{1}{2}, 1 \right[$	0,5											
	(3) (أ) $\lim_{ x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = 0$	0,5											
	(ب)	0,5											
	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x) - y$</td> <td>-</td> <td> </td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>الوضعية</td> <td>(C) أسفل (Δ)</td> <td> </td> <td>(C) أعلى (Δ)</td> </tr> </table>	x		$-\infty$	1	$+\infty$	$f(x) - y$	-		+	الوضعية	(C) أسفل (Δ)	
x	$-\infty$	1	$+\infty$										
$f(x) - y$	-		+										
الوضعية	(C) أسفل (Δ)		(C) أعلى (Δ)										
(ج) $X = x-1, Y = y-2$	1												
معادلة (C) في المعلم $(\omega, \bar{i}, \bar{j})$ هي : $Y = X + \frac{1}{4X}$	1												
الدالة $X \mapsto X + \frac{1}{4X}$ فردية (أو أي طريقة سليمة)	1												
(د) $f\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) = 0, f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0, f(0) = \frac{3}{4}$	0,25×3												

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
	1	الرسم $(4) \lambda \in]-1, 1[$ للمعادلة حلان $\lambda = -1$ أو $\lambda = 1$ للمعادلة حل مضاعف $\lambda \in]-3, -1[\cup]1, 3[$ لا توجد حلول $\lambda = -3$ أو $\lambda = 3$ للمعادلة حل مضاعف $\lambda \in]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$ للمعادلة حلان	
	1		

محاور الموضوع	الموضوع الثاني	عناصر الإجابة	العلامة	
			مجزأة	المجموع
*المتتاليات من الشكل $u_{n+1}=a u_n + b$	حل التمرين الأول (05 نقط)	1. حساب $u_1; u_2; u_3$	3×0.25	05
		2. أ/ إثبات أن $u_n \geq -2$	0,25+0.5	
		ب/ اتجاه تغير المتتالية (u_n)	0.5	
		ماذا تستنتج	0,5	
		3. أ/ إثبات أن (v_n) متتالية هندسية	0.5+2×0.25	
		ب/ عبارة الحد العام v_n	0.25+0.25	
		عبارة الحد العام u_n	0.25	
		ج- $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	0.25	
		د/ حساب المجموع S_n	0,5	
		*مبرهنة القيم المتوسطة و تطبيقاتها	حل التمرين الثاني. (05 نقط)	
ب- احتمال الحصول على 3 قرصات بلونين مختلفين	1			
ج- احتمال الحصول على 3 قرصات مجموعها 15	4×0,5			
د - احتمال الحصول على 3 قرصات مجموعها 15 علما أنهت من نفس اللون	1			
*مبرهنة القيم المتوسطة و تطبيقاتها	حل التمرين الثالث. (05 نقط)	1. النهايات	2×0.25	05
		حساب المشتقة و إشارتها	3×0.25	
		جدول التغيرات و القيمتان الحديتان	3×0.25	
		2. إثبات أن المعادلة تقبل حلا وحيدا على المجال $\left] -\frac{1}{2}; 0 \right[$	5×0.25	
		3. إشارة $P(x)$ مع التبرير	2×0.5	
4. اتجاه تغير الدالة G	3×0.25			
*السلاسل الإحصائية لمتغيرين عددين *سحابة النقط	حل التمرين الرابع: (05 نقط)	1. التمثيل البياني لسحابة النقط	4×0.25	0,5
		2. إحداثيتي النقطة G هي (17.5;1.71) و تعميمها	3×0.25	
		3. أ/ معادلة (Δ)	2×0.5	
		* رسم (Δ)	0.25	
		ب/ نسبة البطالة سنة 2009	2×0.5	
ج/ نسبة البطالة تفوق 3% في سنة	2×0.5			