



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تسيير واقتصاد

دورة: 024

اختبار في مادة: الرياضيات

المدة: 03 سا و 30

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{3}$

(1) احسب u_1 و u_2

(2) أ) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $-2 < u_n \leq 0$

ب) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_n + 2$

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{6}$

ب) اكتب v_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2$

ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع: $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

- احسب S_n بدلالة n ثم استنتج T_n بدلالة n

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير:

(1) المعادلة $2e^{2x} + 3e^x - 2 = 0$ ذات المجهول الحقيقي x :

أ) تقبل حلاً وحيداً. ب) تقبل حلين مختلفين. ج) لا تقبل حلولاً.

(2) $\int_0^1 (3x^2 + 3e^{3x}) dx$ يساوي:

أ) $e^3 + 1$ ب) e^3 ج) $e^3 - 1$

(3) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 2u_n + 1$

عبارة الحد العام u_n هي: أ) $2^{n+1} + 1$ ب) $2^n - 1$ ج) $2^{n+1} - 1$


(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(2x)}{1 + \ln x} \right)$ تساوي: أ) $\ln 2$ ب) 1 ج) 2



اختبار في مادة: الرياضيات // الشعبة: تسيير واقتصاد // بكالوريا 2024

التمرين الثالث: (04 نقاط)

نبيتها تبيينها قواع



المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ في الشكل المقابل، (C_f) التمثيل البياني لدالة f معرفة على \mathbb{R} والذي يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما 1 و α و (T) مماس المنحني (C_f) في النقطة $A(1; 0)$

بقراءة بيانية:

(1) عيّن $f(1)$ و $f'(1)$ ثم أعط معادلة للمماس (T)

(2) بّر أنّ A نقطة انعطاف لـ (C_f)

(3) حلّ في \mathbb{R} المعادلة $f(x) \times f'(x) = 0$

(4) دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R}

- حدّد حسب قيم x إشارة $f(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة F

التمرين الرابع: (08 نقاط)

f الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 1 + \frac{1+2\ln x}{x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسياً.

(2) أ) بيّن أنه: من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{-4\ln x}{x^3}$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) بيّن أنّ المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0,52 < \alpha < 0,53$

(4) أ) ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$

ب) احسب $f(e)$ ثم ارسم كلاً من (Δ) و (C_f)

(5) أ) أثبت أنّ دالة أصلية للدالة $H: x \mapsto \frac{-3-2\ln x}{x}$ دالة أصلية للدالة $h: x \mapsto \frac{1+2\ln x}{x^2}$ على المجال $]0; +\infty[$

ب) استنتج \mathcal{A} مساحة الحيز المستوي المحدّد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما:

$$x=e, \quad x=1$$

اختبار في مادة: الرياضيات // الشعبة: تسيير واقتصاد // بكالوريا 2024

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1) الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = 8x^3 + 1$

الدالة الأصلية للدالة f على \mathbb{R} والتي تتعدم عند 1 هي الدالة F حيث :

(أ) $F(x) = x^4 + x - 2$ (ب) $F(x) = 2x^4 + x - 3$ (ج) $F(x) = 2x^4 - 2x$

(2) الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$

القيمة المتوسطة للدالة g على المجال $[-\ln 2; \ln 2]$ هي:

(أ) $2 \ln 2$ (ب) $\frac{1}{2 \ln 2}$ (ج) $\frac{1}{2}$

(3) للمعادلة $\ln(x-2) + \ln(x-4) = 3 \ln 2$ حل وحيد في المجال $+\infty; 4$ هو:

(أ) 6 (ب) 8 (ج) 9

(4) الدالة h المعرفة على $]-1; 1[$ بـ: $h(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ هي دالة:

(أ) زوجية. (ب) فردية. (ج) لا زوجية ولا فردية.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

P الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $P(X) = (2X-1)(X^2+X-2)$

(1) ادرس إشارة $P(X)$ حسب قيم X من \mathbb{R}

(2) (أ) حل في المجال $+\infty; 0$ للمعادلة: $(2 \ln x - 1)((\ln x)^2 + \ln x - 2) = 0$

(ب) استنتج في المجال $+\infty; 0$ حلول المتراجحة: $(2 \ln x - 1)((\ln x)^2 + \ln x - 2) < 0$

(3) حل في المجال $+\infty; -1$ للمعادلة: $(\ln(x+1))^2 + \ln(x+1) - 2 = 0$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - \frac{1}{2}$

(1) احسب u_1 و u_2

(2) ابرهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -2$

(ب) اثبت أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً



اختبار في مادة: الرياضيات // الشعبة: تسيير واقتصاد // بكالوريا 2024

(3) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_n + 2$

(أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$

(ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) احسب بدلالة n كلاً من المجموعين S_n و T_n حيث:

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n \quad \text{و} \quad T_n = \frac{1}{2+u_0} + \frac{1}{2+u_1} + \frac{1}{2+u_2} + \dots + \frac{1}{2+u_n}$$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة g

(2) احسب $g(0)$ ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x ، $g(x) \geq 0$

(II) الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = x + (x+2)e^{-x}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(2) (أ) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) اكتب معادلة (T) مماس المنحني (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0

(4) (أ) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $+\infty$

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

(5) (أ) بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $-1,69 < \alpha < -1,68$

(ب) ارسم (T) و (Δ) ثم (C_f)

(6) (أ) بين أن الدالة $H: x \mapsto -(x+3)e^{-x}$ هي دالة أصلية للدالة $h: x \mapsto (x+2)e^{-x}$ على \mathbb{R}

(ب) احسب \mathcal{M} مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيمت التي معادلاتها:

$$x = 2 \quad , \quad x = 0 \quad , \quad y = x$$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
العلامة	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
0,5	0,25 × 2	$u_2 = -\frac{11}{18}$ و $u_1 = -\frac{1}{3}$ (1)
1,5	0,75 + 0,25	(أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل n من \mathbb{N} : $-2 < u_n \leq 0$
	0,25 × 2	(ب) $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{6}(u_n + 2)$ المتتالية (u_n) متناقصة تماما.
1,25	0,5	(أ) $v_{n+1} = \frac{5}{6}v_n$ ومنه: (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{6}$
	0,25 × 2	(ب) $v_n = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n$ ، $u_n = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2$
	0,25	(ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$
0,75	0,25 + 0,5	$T_n = 12\left[1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n+1}\right] - 2(n+1)$ ، $S_n = 12\left[1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n+1}\right]$ (4)
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	0,5 × 2	(أ) الإجابة: للمعادلة حلٌ وحيد هو $-\ln 2$ (1)
1	0,5 × 2	(ب) الإجابة: $\int_0^1 (3x^2 + 3e^{3x}) dx = [x^3 + e^{3x}]_0^1 = e^3$ (2)
1	0,5 × 2	(ج) الإجابة: $u_n = 2^{n+1} - 1$ ، u_0 يُحقق الحالة (ج) فقط. (3)
1	0,5 × 2	(ب) الإجابة: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(2x)}{1 + \ln x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{\ln 2}{\ln x} + 1}{\frac{1}{\ln x} + 1}\right) = 1$ (4)
التمرين الثالث (04 نقاط)		
1	0,5 + 0,25 × 2	(1) $(T): y = -x + 1$ ، $f'(1) = -1$ ، $f(1) = 0$
1	1	(2) من الوضع النسبي لـ (C_f) و (T) : A نقطة انعطاف لـ (C_f)
1	1	(3) $f(x) = 0$ أو $f'(x) = 0$ ومنه: $S = \{\alpha; 0; 1\}$
1	0,5	إشارة $f(x)$
	0,25 × 2	(4) F متناقصة تماما على كل من $]-\infty; \alpha[$ و $]1; +\infty[$ ومتزايدة تماما على $[\alpha; 1]$
التمرين الرابع (08 نقاط)		
1,5	0,5 × 2	(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$
	0,25 × 2	التفسير الهندسي.
2,25	1	(2) (أ) من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{-4 \ln x}{x^3}$

	0,25 × 2 0,75	<p>(ب) f متزايدة تماما على $[0; 1]$ ومتناقصة تماما على $[1; +\infty[$</p> <p>جدول التغيرات</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>$+\infty$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\infty$</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	x	0	1	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	$f(x)$	$-\infty$	2	1	
x	0	1	$+\infty$												
$f'(x)$	+	0	-												
$f(x)$	$-\infty$	2	1												
1	1	<p>f مستمرة ومتزايدة تماما على $[0,52; 0,53]$ و $f(0,52) \times f(0,53) < 0$ ومنه (c_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $0,52 < \alpha < 0,53$</p>	(3)												
	0,25 0,75	<p>(أ) $f(x) - 1 = \frac{1 + 2 \ln x}{x^2}$</p> <p>لما $0 < x < \frac{1}{\sqrt{e}}$: (c_f) أسفل (Δ) ولما $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$: (c_f) أعلى (Δ)</p> <p>$(\Delta) \cap (c_f) = \left\{ A \left(\frac{1}{\sqrt{e}}; 1 \right) \right\}$</p>													
2,25	0,25 1	<p>(ب) $f(e) = 1 + \frac{3}{e^2}$</p> <p>الرسم:</p>	(4)												
	0,5	<p>(أ) من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $H'(x) = h(x)$ ،</p>													
1	0,5	<p>(ب) $\int_1^e \frac{1 + 2 \ln x}{x^2} dx = [H(x)]_1^e = 3 - \frac{5}{e}$ ومنه:</p> <p>$\mathcal{A} = \left(3 - \frac{5}{e} \right) u.a$</p>	(5)												

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
العلامة	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
1	1	(1) الإجابة: (ب) ، (التبرير غير مطلوب)
1	1	(2) الإجابة: (ج) ، (التبرير غير مطلوب)
1	1	(3) الإجابة: (أ) ، (التبرير غير مطلوب)
1	1	(4) الإجابة: (ب) ، (التبرير غير مطلوب)
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	1	(1) $P(X)$ سالب تماما على المجالين $]-\infty; -2[$ و $]\frac{1}{2}; 1[$ وموجب تماما على المجالين $]-2; \frac{1}{2}[$ و $]1; +\infty[$ وينعدم عند كل من -2 ، $\frac{1}{2}$ ، 1
2	1	(2) (أ) مجموعة الحلول هي: $\{e^{-2}; e; \sqrt{e}\}$
	1	(ب) مجموعة الحلول هي: $]0; e^{-2}[\cup]\sqrt{e}; e[$
1	1	(3) مجموعة الحلول هي: $\{e^{-2}-1; e-1\}$
التمرين الثالث (04 نقاط)		
0,5	0,5	(1) $u_2 = \frac{11}{8}$ ، $u_1 = \frac{5}{2}$
1	0,75+0,25	(أ) البرهان بالتراجع أنه من أجل كل n من \mathbb{N} : $u_n > -2$
0,5	0,5	(ب) من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{4}(u_n + 2)$ ، ومنه : (u_n) متناقصة تماما.
1,5	0,25+0,5	(أ) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$ ، $q = \frac{3}{4}$
	0,25	(ب) $u_n = v_n - 2 = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$ ، $v_n = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n$
	0,25	(ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$
0,5	0,25×2	(4) $T_n = \frac{1}{2}\left(\left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1\right)$ ، $S_n = 24\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$
التمرين الرابع (08 نقاط)		
1,25	0,75 0,5	(1(I) من أجل كل x من \mathbb{R} فإن $g'(x) = xe^{-x}$
0,5	0,25×2	g متناقصة تماما على $]-\infty; 0[$ و متزايدة تماما على $]0; +\infty[$
0,75	0,5+0,25	(2) $g(0) = 0$ ومنه: من أجل كل x من \mathbb{R} فإن $g(x) \geq 0$
1	0,5	(1(II) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
		(أ) من أجل كل x من \mathbb{R} فإن $f'(x) = g(x)$

	0,25	<p>(ب) الدالة f متزايدة تماما على \mathbb{R}</p> <p>جدول التغيرات:</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>$+$</td> <td>0</td> <td>$+$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\infty$</td> <td>2</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f'(x)$	$+$	0	$+$	$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$	
x	$-\infty$	0	$+\infty$												
$f'(x)$	$+$	0	$+$												
$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$												
0,25	0,25		(3) $(T): y = 2$												
1,25	0,5	<p>(أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$</p> <p>ومنه $y = x$ (Δ): مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$</p>	(4)												
	0,75	<p>(ب) من $f(x) - x = (x+2)e^{-x}$ نجد: (C_f) أسفل (Δ) على $]-\infty; -2[$ وأعلى (Δ) على $]-2; +\infty[$ ويقطعه في النقطة $A(-2; -2)$</p>													
	1	<p>(أ) f مستمرة و متزايدة تماما على $[-1,69; -1,68]$ و $f(-1,69) \times f(-1,68) < 0$ ومنه: للمعادلة $f(x) = 0$ حلٌ وحيد α حيث $-1,69 < \alpha < -1,68$</p>	(5)												
2	0,5	<p>(ب) الرسم:</p>													
	0,5		رسم (Δ) و (T)												
	0,5		رسم (C_f)												
	0,5		(6) (أ) من أجل كل x من \mathbb{R} ، $H'(x) = h(x)$												
1	0,5		(ب) $A = \int_0^2 (f(x) - x) dx = H(2) - H(0) = \left(3 - \frac{5}{e^2}\right) u.a$												

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.