



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية

دورة: جوان 2015

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

نعتبر النقط  $A(1;5;4)$  ،  $B(10;4;3)$  ،  $C(4;3;5)$  و  $D(0;4;5)$ .

(1) أ) بين أن النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  ليست في استقامية.

ب) بين أن النقط  $A$  ،  $B$  ،  $C$  و  $D$  من نفس المستوي.

ج) استنتج أن النقطة  $D$  هي مرجح النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  المرفقة بمعاملات يُطلب تعيينها.

د) عيّن إحداثيات النقطة  $E$  نظيرة النقطة  $A$  بالنسبة إلى النقطة  $D$ .

هـ) اكتب معادلة ديكرتية للمستوي  $(\mathcal{P})$  المحوري للقطعة  $[AE]$ .

(2) عيّن  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M$  من الفضاء حيث :  $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = \|3\vec{MD} - 3\vec{MA}\|$ .

(3) أ) تحقق أن النقطة  $F(1;8;10)$  تنتمي إلى المستوي  $(\mathcal{P})$ .

ب) المستقيم  $(FD)$  يقطع  $(\Gamma)$  في النقطتين  $G$  و  $H$ .

حدّد طبيعة الرباعي  $AGEH$  ، ثم احسب مساحته.

(4)  $(\Delta)$  المستقيم الذي يشمل النقطة  $D$  ويعامد المستوي  $(AEH)$ .

أ) بين أن الشعاع  $\vec{AC}$  ناظمي للمستوي  $(AEH)$ .

ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $t$  ، النقطة  $N(3t; 4-2t; 5+t)$  تنتمي إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

ج) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $t$  ، حجم الجسم  $NAGEH$  هو  $v(t)$  حيث  $v(t) = 2|t|\sqrt{14} uv$ .

(  $uv$  وحدة الحجم).

د) عيّن إحداثيات كل من النقطتين  $N_1$  و  $N_2$  من  $(\Delta)$  اللتين يكون من أجليهما  $v(t) = 2\sqrt{3} uv$ .



### التمرين الثاني: (05 نقاط)

ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . نعتبر النقط  $A, B, C, H$  و  $I$  لاحقاتها

على الترتيب:  $z_A = i, z_B = -2 + i, z_C = -3, z_H = -3 + 4i$  و  $z_I = -1 - i$ .

(1) أ) مثلّ النقط  $A, B, C, H$  و  $I$  في المعلم  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

ب) عيّّن النسبة وزاوية للتشابه المباشر الذي مركزه  $B$  ويحوّل النقطة  $A$  إلى النقطة  $C$ .

(2) عيّّن  $z_G$  لاحقة النقطة  $G$  مركز ثقل المثلث  $ABC$ .

(3) أ) اكتب على الشكل الجبري العدد المركّب  $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A}$ .

ب) استنتج أن المستقيمين  $(AH)$  و  $(BC)$  متعامدان.

ج) بيّن أن  $H$  هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث  $ABC$ .

(4) بيّن أن النقط  $G, H, I$  في استقامية.

(5)  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوي ذات الاحقة  $z$  حيث:  $z + 1 + i = \sqrt{5}e^{i\theta}$  مع  $\theta \in \mathbb{R}$ .

أ) بيّن أن النقطة  $A$  تنتمي إلى المجموعة  $(\Gamma)$ .

ب) عيّّن طبيعة المجموعة  $(\Gamma)$  مع تحديد عناصرها المميزة.

ج) أنشئ المجموعة  $(\Gamma)$ .

د) تحقّق أن النقطتين  $B$  و  $C$  تنتميان إلى المجموعة  $(\Gamma)$ .

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

(1) أ) عيّّن حسب قيم العدد الطبيعي  $n$ ، باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^n$  على 7.

ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد  $[2015^{53} - 1954^{1962} + 1962^{1954}]$  على 7.

(2) أ) بيّن أن 89 عدد أولي.

ب) عيّّن كل القواسم الطبيعية للعدد 7832.

ج) بيّن أن العددين 981 و 977 أوليان فيما بينهما.

(3)  $x$  و  $y$  عدنان طبيعيان غير معدومين قاسماهما المشترك الأكبر هو 2.

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 31328 \\ x - y \equiv 8[22] \end{cases}$$

عيّن  $x$  و  $y$  علماً أن:

(4)  $a, b, c$  أعداد طبيعية غير معدومة حيث  $a$  أولي مع  $b$  و  $a$  أولي مع  $c$ .

أ) باستعمال مبرهنة بيزو، برهن أن  $a$  أولي مع  $b \times c$ .

ب) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$ ،  $PGCD(a; b^n) = 1$ .

(يُرمز  $PGCD$  إلى القاسم المشترك الأكبر.)

ج) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين  $1954^{1962}$  و  $1962^{1954}$ .



### التمرين الرابع: (07 نقاط)

الدالة المعرفة بـ:  $f(0)=1$  ، ومن أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0;+\infty[$  ،  $f(x)=1-x^2 \ln x$  ،  $(\mathcal{C}_f)$  منحنى الدالة  $f$  الممثل في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أ) ادرس استمرارية الدالة  $f$  عند  $0$  من اليمين.

ب) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-1}{x}$  ، ثم فسّر النتيجة هندسياً.

(2) أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) أ) بين أن المعادلة  $f(x)=0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  في المجال  $]0;+\infty[$ .

ب) تحقق أن  $1,531 < \alpha < 1,532$

(4) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $g(x)=f(|x|)$

$(\mathcal{C}_g)$  المنحنى الممثل للدالة  $g$  في نفس المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

أ) ادرس شفعية الدالة  $g$ .

ب) أنشئ المنحنى  $(\mathcal{C}_g)$  على المجال  $[-2;2]$ .

(5) باستعمال الكاملة بالتجزئة ، عيّن الدالة الأصلية للدالة  $x \mapsto x^2 \ln x$  المعرفة على المجال  $]0;+\infty[$  ، والتي تتعدم من أجل القيمة 1.

(6)  $t$  عدد حقيقي ينتمي إلى المجال  $]0;\alpha[$  . نضع  $F(t) = \int_t^\alpha f(x) dx$

أ) اكتب العبارة  $F(t)$  بدلالة  $t$  و  $\alpha$ .

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $t$  من المجال  $]0;\alpha[$  ،  $F(t) = \frac{-3t f(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$

ج) احسب  $\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t)$

(7)  $m$  عدد حقيقي ينتمي إلى المجال  $]0;\alpha[$ .

$\mathcal{S}(m)$  مساحة الدائرة ذات المركز المبدأ  $O$  ونصف القطر  $m$ .

نفرض أن مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى  $(\mathcal{C}_g)$  ، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين

معادلتيهما على الترتيب:  $x = -\alpha$  و  $x = \alpha$  ، هي:  $\mathcal{A}$  حيث:  $\mathcal{A} = \frac{2}{9}(\alpha^3 + 6\alpha) ua$

( $ua$  وحدة المساحات).

أ) عيّن القيمة المضبوطة للعدد  $m$  حتى يكون  $\mathcal{S}(m) = 2\mathcal{A}$ .

ب) علماً أن  $3,140 < \pi < 3,142$  أعط حصرًا للعدد  $m$ .



## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (04 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة ، في كل حالة من الحالات الأربع الآتية ، مع التعليل.

(1) الحد العام للمتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة بـ:  $u_0 = 3$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$  هو:

$$\text{أ) } u_n = -3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 6 \quad ; \quad \text{ب) } u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad ; \quad \text{ج) } u_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{3}{2}$$

(2) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. مجموعة النقط  $M$  من المستوي، ذات اللاحقة  $z$ ، حيث

$$\text{أ) دائرة نصف قطرها 3 ولاحقة مركزها } 1+i.$$

$$\text{ب) دائرة نصف قطرها 3 ولاحقة مركزها } 1-i.$$

$$\text{ج) دائرة نصف قطرها 3 ولاحقة مركزها } -1+i.$$

(3)  $a$  ،  $b$  ،  $c$  و  $d$  أعداد طبيعية غير معدومة وأصغر من أو تساوي 9.

$\overline{abcd}$  عدد طبيعي مكتوب في النظام العشري.

من أجل كل الأعداد  $a$  ،  $b$  ،  $c$  و  $d$  : يكون العدد  $\overline{abcd}$  يقبل القسمة على 11 إذا وفقط إذا كان:

$$\text{أ) العدد } (a-b+c-d) \text{ يقبل القسمة على 11.}$$

$$\text{ب) العدد } (a+b+c+d) \text{ يقبل القسمة على 11.}$$

$$\text{ج) العدد } \overline{cd} \text{ المكتوب في النظام العشري، يقبل القسمة على 11.}$$

(4) الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. مجموعة النقط  $M$  من الفضاء ذات الإحداثيات  $(x; y; z)$  حيث

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{2}{3}t - k \\ y = 2 - t + \frac{3}{2}k \\ z = -3 + 4t - 6k \end{cases} \quad ; (t \in \mathbb{R}); (k \in \mathbb{R})$$

هي: أ) المجموعة  $\{A\}$  حيث  $A(1; 2; -3)$ .

ب) المستقيم الذي يشمل النقطة  $A(1; 2; -3)$  و  $\vec{u}\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{2}; -2\right)$  شعاع توجيه له.

ج) المستوي الذي يشمل النقطة  $A(1; 2; -3)$  و  $\vec{n}(3; -2; -1)$  شعاع ناظمي له.

### التمرين الثاني: (05 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  التالية:

$$z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 8 = 0 \quad (\text{لاحظ أن: } (1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3})$$

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

$A$  و  $B$  نقطتان من المستوي ، لاحتقاهما على الترتيب:  $z_A = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})$  و  $z_B = \overline{z_A}$ .



$$(2) \text{ أ) بين أن: } \frac{z_B}{z_A} = e^{-\frac{7\pi}{6}i}$$

ب) استنتج عمدة للعدد المركب  $z_A$ .

$$\text{ج) استنتج القيمة المضبوطة لكل من العددين } \cos \frac{7\pi}{12} \text{ و } \sin \frac{7\pi}{12}.$$

(3) أ) حل ، في مجموعة الأعداد الصحيحة ، المعادلة ذات المجهول  $(x; y)$  التالية:  $7x - 2y = 1$ .

ب) بين أنه إذا كانت الثنائية  $(x; y)$  من الأعداد الصحيحة ، حلا للمعادلة  $7x - 24y = 12$  فإن  $x$  يكون مضاعفا للعدد 12.

ج) استنتج كل الثنائيات  $(x; y)$  من الأعداد الصحيحة ، حولا للمعادلة  $7x - 24y = 12$ .

د) عين مجموعة قيم العدد الطبيعي  $n$  التي يكون من أجلها العدد  $(z_A)^n$  عددا حقيقيا سالبا تماما.

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

نعتبر النقطتين  $A(2; 0; 0)$  و  $B(-1; -5; -1)$ .

$(\Delta_1)$  المستقيم الذي يشمل النقطة  $A$  و  $\vec{u}(-1; 2; -1)$  شعاع توجيه له.

$$(\Delta_2) \text{ المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيط التالي: } \begin{cases} x = -3 - 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 7 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

(d) المستقيم الذي يشمل النقطة  $B$  و  $\vec{v}(2; 5; 3)$  شعاع توجيه له.

(1) بين أن المستقيمين  $(\Delta_1)$  و  $(\Delta_2)$  يتقاطعان في النقطة  $C$  يُطلب تعيين إحداثياتها.

(2) بين أن المستقيمين  $(\Delta_1)$  و (d) ليسا من نفس المستوي.

(3) أ) اكتب تمثيلا وسيطيا للمستوي  $(\mathcal{P})$  الذي يشمل المستقيمين  $(\Delta_1)$  و  $(\Delta_2)$ .

ب) استنتج أن  $4x + 3y + 2z - 8 = 0$  هي معادلة ديكارتية للمستوي  $(\mathcal{P})$ .

ج) تحقق من أن النقطة  $C$  هي المسقط العمودي للنقطة  $B$  على المستوي  $(\mathcal{P})$ .

(4) أ) بين أنه توجد نقطة وحيدة  $I$  من المستقيم (d) وتوجد نقطة وحيدة  $D$  من المستقيم  $(\Delta_2)$  حيث تكون

النقط  $A, I, D$  في استقامة؛ يُطلب تعيين إحداثيات النقطتين  $I$  و  $D$ .

ب) بين أن النقطة  $I$  هي منتصف القطعة  $[AD]$ .

(5) النقطة  $K$  مرجح الجملة المثقلة  $\{(B; 1), (I; 2)\}$  والنقطة  $G$  المسقط العمودي للنقطة  $K$  على

المستوي  $(\mathcal{P})$ .

أ) بين أن النقطة  $G$  هي مرجح النقط  $A, C, D$  المرفقة بمعاملات يُطلب تعيينها.

ب) استنتج إحداثيات النقطة  $G$ .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

الدالة المعرفة بـ:  $f(0) = 0$  ومن أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]-\infty; 0[$  ،  $f(x) = (x-1)e^{\frac{1}{x}}$  ، المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) ادرس استمرارية الدالة  $f$  عند 0 من اليسار.

(2) احسب  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x}$  ، ثم فسّر النتيجة هندسياً.

(3) أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) أ) بيّن أنّ  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = 0$

ب) استنتج أنّ المنحنى  $(C_f)$  يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً  $(\Delta)$  بجوار  $-\infty$  ، يُطلب تعيين معادلة له.

(5) الدالة المعرفة على المجال  $]-\infty; 0[$  بـ:  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$

أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكّل جدول تغيراتها.

(6) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]-\infty; 0[$  ،  $f(x) > x$

ب) استنتج وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

ج) أنشئ المنحنى  $(C_f)$ .

(7) المتتالية المعرفة بـ:  $u_0 = -3$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_{n+1} = f(u_n)$

أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_n < 0$

ب) حدّد اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$ .

ج) بيّن أنّ المتتالية  $(u_n)$  متقاربة ، ثمّ عيّن  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(8)  $m$  عدد حقيقي. الدالة ذات المتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على المجال  $]-\infty; 0[$  بـ:

$$h_m(x) = x e^{\frac{1}{x}} - mx$$

أ) احسب  $h'_m(x)$  حيث  $h'_m$  هي الدالة المشتقة للدالة  $h_m$ .

ب) باستعمال المنحنى  $(C_f)$  ، ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  ، عدد حلول المعادلة

$$h'_m(x) = 0$$

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2015

اختبار في مادة: الرياضيات الشعبة: رياضيات المدة: 04 ساعات ونصف

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة		
		<b>التمرين الأول: (04 نقاط)</b>	
<b>04 نقاط</b>	0,25	1. أ - النقط $A$ ، $B$ و $C$ ليست في استقامية لأن $\overrightarrow{AB}(9; -1; -1) \wedge \overrightarrow{AC}(3; -2; 1)$	
	0,5	ب - النقط $A$ ، $B$ ، $C$ و $D$ من نفس المستوي لأن $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$	
	0,25	ج - من ب - أو $2\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} + 2\overrightarrow{DC} = \vec{0}$ ينتج $D$ مرجح $\{(A; 2), (B; -1), (C; 2)\}$	
	0,25	د - $D$ منتصف $[AE]$ ومنه $E(-1; 3; 6)$	
	0,25	هـ - $\overrightarrow{n}(\mathcal{P}) = \overrightarrow{AD}$ و $D \in (\mathcal{P})$ أو $MA = ME$ ومنه: $x + y - z + 1 = 0$	
	0,5	2. $(\Gamma)$ هي سطح الكرة ذات المركز $D$ ونصف القطر $AD$ حيث $AD = ED = \sqrt{3}$	
	0,25	3 أ - $F \in (\mathcal{P})$	
	0,25	ب - $[AE]$ و $[GH]$ متعامدتان، متقايستان ومتناصفتان في $D$ ومنه $AGEH$ مربع.	
	0,25	$s(AGEH) = 2AD^2 = 6ua$	
	0,5	4. أ - $(AEH)$ معين بالشعاعين $AE$ و $DF$ و $AE \perp AC$ و $DF \perp AC$	
	0,25	ب - $DN = t \cdot AC$ إن $DN$ و $AC$ مترتبان خطيا وبالتالي $N \in (\Delta)$	
	0,25	ج - $v(t) = \frac{1}{3}DN \times s(AGEH) = 2\sqrt{14}t^2 = 2 t \sqrt{14}uv$	
	0,25	د - $N_1\left(3\sqrt{\frac{3}{14}}; 4 - 2\sqrt{\frac{3}{14}}; 5 + \sqrt{\frac{3}{14}}\right)$ ، $N_2\left(-3\sqrt{\frac{3}{14}}; 4 + 2\sqrt{\frac{3}{14}}; 5 - \sqrt{\frac{3}{14}}\right)$	
			<b>التمرين الثاني: (05 نقاط)</b>
<b>03 نقاط</b>	0,5	1. أ - تمثيل النقط $A$ ، $B$ ، $C$ ، $H$ و $I$ في المعلم $(O; \vec{u}, \vec{v})$	
	0,5	ب - $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{4}}$ إذا نسبة التشابه المباشر هي $\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\frac{5\pi}{4}$ زاوية له.	
	0,25	2. $z_G = -\frac{5}{3} + \frac{2}{3}i$	
	0,5	3. أ - $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A} = -\frac{1}{3}i$	
	0,5	ب - $\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A}$ هو عدد تخيلي صرف إذا المستقيمان $(AH)$ و $(BC)$ متعامدان.	
	0,75	ج - $\frac{z_A - z_C}{z_H - z_B} = -i$ وهو تخيلي صرف ومنه $(BH) \perp (AC)$ ؛ بما أن ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة فإن $H$ هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث $ABC$ .	

العلامة		عناصر الإجابة	تابع للموضوع الأول
مجموع	مجزأة		
02 نقاط	0,5	4. $\frac{z_H - z_I}{z_H - z_G} = \frac{3}{2}$ وهو حقيقي ومنه $(GH) \parallel (IH)$ إذن النقط $G, H, I$ في استقامة.	
	0,5	5. أ - $z_A + 1 + i = 1 + 2i$ ، إذا $ z_A + 1 + i  = \sqrt{5}$ أي $A \in (\Gamma)$ .	
	0,25	ب - $z = z_I + \sqrt{5}e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$ إذن $(\Gamma)$ هي دائرة مركزها $I$ ونصف قطرها $\sqrt{5}$ .	
	0,25	ج - إنشاء الدائرة $(\Gamma)$ من المركز $I$ وتمر بالنقطة $A$ .	
	0,5	د - $ z_B - z_I  = \sqrt{5}$ ، $ z_C - z_I  = \sqrt{5}$ إذن $IB = IC = \sqrt{5}$ أي $B \in (\Gamma)$ و $C \in (\Gamma)$ .	
		التمرين الثالث: (04 نقاط)	
04 نقاط	0,5	1. أ - من أجل كل عدد طبيعي $k$ ، $2^{3k} \equiv 1[7]$ ، ومنه $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ و $2^{3k+2} \equiv 4[7]$ .	
	0,5	ب - $1962^{1954} - 1954^{1962} + 2015^{53} \equiv 0[7]$	
	0,25	2. أ - 89 عدد أولي لأنه لا يقبل القسمة على 2، 3، 5، 7 و $11^2 > 89$ .	
	0,5	ب - $D_{7832} = \{1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88, 89, 178, 356, 712, 979, 1958, 3916, 7832\}$	
	0,25	ج - باستعمال خوارزمية إقليدس أو تحليل 981 نجد $PGCD(981, 977) = 1$ .	
	0,5	3. $x'^2 - y'^2 = 7832$ و $PGCD(x'; y') = 1$ و $x' - y' \equiv 4[11]$ إذا $(x'; y') = (981; 977)$ ومنه $(x; y) = (1962; 1954)$ .	
	0,25	4. أ - باستعمال مبرهنة بيزو ، البرهان أن $a$ أولي مع $b \times c$ .	
	0,5	ب - باستعمال الاستدلال بالتراجع، إثبات أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $PGCD(a; b^n) = 1$ .	
0,75	ج - $pgcd(981^{1954}; 977) = 1$ ؛ $pgcd(981^{1954}; 977^{1962}) = 1$ ؛ $pgcd(981^{1954}; 2^8) = 1$ ؛ من 4. أ. ينتج $pgcd(1962^{1954}; 1954^{1962}) = 2^{1954} pgcd(981^{1954}; 977^{1962} \times 2^8) = 2^{1954}$		
		التمرين الرابع: (07 نقاط)	
03,25 نقطة	0,5	1. أ - $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 = f(1)$ ، ومنه الدالة $f$ مستمرة على $0$ .	
	0,25	ب - $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln x = 0$	
	0,25	التفسير الهندسي: $(C_f)$ يقبل نصف مماس في $A(0; 1)$ معادلته $y = 1$ و $x \geq 0$ .	
	0,25	2. أ - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	
	0,75	ب - من أجل $x \in ]0; +\infty[$ ، $f'(x) = -x(2 \ln x + 1)$ ، الإشارة + الإشارة	
	0,25	$f$ متزايدة تماما على $[0; e^{\frac{1}{2}}]$ ومنتاقصة تماما على $[e^{\frac{1}{2}}; +\infty[$	
	0,25	جدول تغيرات الدالة $f$ .	
0,75	3. أ - تبين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha$ في المجال $[0; +\infty[$ .		

العلامة		عناصر الإجابة	تابع للموضوع الأول
مجموع	مجزأة		
03,75 نقطة	0,5	ب - $f(1,532) \approx -0,001$ ؛ $f(1,531) \approx 0,002$ إذاً $f(1,532) < f(\alpha) < f(1,531)$	
	0,25	أ - الدالة $g$ زوجية لأن $\mathbb{R}$ متناظر بالنسبة إلى 0 و $g(-x) = g(x)$	
	1	ب - إنشاء المنحنى $(\mathcal{C}_g)$ على المجال $[-2; 2]$ .	
	0,5	5. $x \mapsto \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{9}$ هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^2 \ln x$ على المجال $]0; +\infty[$ والتي تتعدم من أجل القيمة 1.	
	0,25	6. $F(t) = \left( \alpha - \frac{1}{3}\alpha^3 \ln \alpha + \frac{1}{9}\alpha^3 \right) - \left( t - \frac{1}{3}t^3 \ln t + \frac{1}{9}t^3 \right)$ - أ	
	0,25	ب - من $\ln(\alpha) = \frac{1}{\alpha^2}$ ؛ $\ln(t) = \frac{1-f(t)}{t^2}$ إذاً $F(t) = \frac{-3t f(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$	
	0,5	ج - لدينا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ إذاً $\lim_{t \rightarrow 0} F(t) = \frac{\alpha^3 + 6\alpha}{9}$	
	0,25	7. أ - القيمة المضبوطة للعدد $m$ حتى يكون $\mathcal{S}(m) = \mathcal{Z}\mathcal{A}$ هي: $\frac{2}{3} \sqrt{\frac{\alpha^3 + 6\alpha}{\pi}}$	
0,25	ب - علماً أن $3,140 < \pi < 3,142$ و $1,531 < \alpha < 1,532$ نجد: $1,344 < m < 1,346$ .		

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة		
04 نقاط			التمرين الأول: (04 نقاط)
	1	1. الاقتراح الصحيح (أ) + التعليل (يمكن حساب $u_1$ في كل حالة أو $\frac{1}{2}u_n + 3$ بدلالة $n$ )	
	1	2. الاقتراح الصحيح (ب) + التعليل ( $ z - 1 - i  = 3$ معناه $ z - 1 + i  = 3$ )	
	1	3. الاقتراح الصحيح (أ) + التعليل (يمكن استعمال خواص الموافقة بترديد 11)	
1	4. الاقتراح الصحيح (ب) + التعليل (في التمثيل الوسيط يمكن ملاحظة أن الشعاعين مرتبطان خطياً)		
			التمرين الثاني: (05 نقاط)
03,25 نقطة	1,25	1. $z \in \left\{ (1 - \sqrt{3}) - i(1 + \sqrt{3}); (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) \right\}$ معناه $z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 8 = 0$	
	0,75	2. أ - $\frac{z_B}{z_A} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{\frac{5\pi}{6}i} = e^{-\frac{7\pi}{6}i}$	
	0,75	ب - $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = -2\arg(z_A) = -\frac{7\pi}{6}$ ومنه $\arg(z_A) = \frac{7\pi}{12}$	
	0,5	ج - $\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ و $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$	

01,75 نقطة	0,5	3. أ - حلول المعادلة $7x - 2y = 1$ هي كل الثنائيات $(2k+1; 7k+3)$ مع $k \in \mathbb{Z}$ .
	0,25	ب - $7x = 12(1+2y)$ ومنه $x$ مضاعف لـ 12 حسب مبرهنة غوص.
	0,5	ج - حلول المعادلة $7x - 24y = 12$ هي: $x = 24k + 12$ و $y = 7k + 3$ مع $k \in \mathbb{Z}$ .
	0,5	د - $n = 24k + 12$ مع $k \in \mathbb{N}$ .
<b>التمرين الثالث: (04 نقاط)</b>		
04 نقاط	0,5	1. $C \in (\Delta_1) \cap (\Delta_2)$ ومنه $C(3; -2; 1)$
	0,5	2. $(\Delta_1)$ و $(d)$ غير متوازيين وغير متقاطعين وعليه فهما ليسا من نفس المستوي
	0,5	3. أ - $\begin{cases} x = 3 - \alpha - 3\beta \\ y = -2 + 2\alpha + 2\beta; (\alpha \in \mathbb{R}); (\beta \in \mathbb{R}) \\ z = 1 - \alpha + 3\beta \end{cases}$ وهو تمثيل وسيطي للمستوي $(\mathcal{P})$ .
	0,25	ب - استنتاج أن $4x + 3y + 2z - 8 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$ .
	0,25	ج - $C \in (\mathcal{P})$ و $\overline{BC}$ عمودي على المستوي $(\mathcal{P})$ .
	0,75	4. أ - $I \in (d) \cap (\mathcal{P})$ ومنه $I(1; 0; 2)$ ؛ $D \in (\Delta_2) \cap (IA)$ ومنه $D(0; 0; 4)$ .
	0,25	ب - $I$ منتصف $[AD]$ لأن $\overline{IA} = -\overline{ID}$ أو $I\left(\frac{x_A + x_D}{2}; \frac{y_A + y_D}{2}; \frac{z_A + z_D}{2}\right)$
	0,5	5. أ - $(BC) \parallel (KG)$ حسب طاليس في $BIC$ نجد $\frac{IG}{IC} = \frac{1}{3}$ ومنه $G$ مرجح $\{(C; 1), (I; 2)\}$ وعليه $G$ مرجح $\{(C; 1), (A; 1), (D; 1)\}$ أي $G$ مركز ثقل $ACD$ .
	0,5	ب - $G\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{5}{3}\right)$
	<b>التمرين الرابع (07 نقاط)</b>	
02,50 نقطة	0,25	1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ إذن الدالة $f$ مستمرة على يسار 0.
	0,25	2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x - \lim_{t \rightarrow \infty} te^t = 0$
	0,25	التفسير الهندسي: $(c_f)$ يقبل نصف مماس مواز لحامل محور الفواصل في المبدأ $O$ .
	0,25	3. أ - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
	0,5	ب - لكل $x \in ]-\infty; 0[$ : $f'(x) = \left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2}\right)e^x$ ؛ $f'(x) > 0$
	0,25	$f$ متزايدة تماما على المجال $]-\infty; 0[$ .
	0,25	جدول تغيرات الدالة $f$ .
	0,25	4. أ - $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{t} - e^t - \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} - e^t = 0$
	0,25	ب - المنحنى $(c_f)$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا $(\Delta)$ بجوار $-\infty$ ، $y = x$ معادلة له.

العلامة		عناصر الإجابة	تابع للموضوع الثاني
مجموع	مجزأة		
04,50 نقطة	0,25		5. أ - $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$
	0,5		ب - لكل $x$ من المجال $]-\infty; 0[$ : $g'(x) = e^{\frac{1}{x}} \times \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{x}$ ؛ $g'(x) < 0$
	0,25		ج - $g$ متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0[$ .
	0,25		جدول تغيرات الدالة $g$ .
	0,25		6. أ - من أجل كل $x$ من $]-\infty; 0[$ ، $0 < g(x) < 1$ ، معناه $0 < f(x) < 1$
	0,25		ب - $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ ؛ $f(0) = 0$ إذا يتقاطعان في المبدأ $O$ .
	0,5		ج - إنشاء المنحنى $(C_f)$ .
	0,75		7. أ - باستعمال الاستدلال بالتراجع يكون من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n < 0$ .
	0,25		ب - المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما لأن $u_n < f(u_n) < 0$
	0,25		ج - المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد $0$ إذن هي متقاربة نحو $l$ .
	0,25		بما أن $f$ مستمرة على $]-\infty; 0[$ فإن $f(l) = l$ ومنه $l = 0$ أي $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .
	0,5		8. أ - لكل $x$ من المجال $]-\infty; 0[$ ، $h'_m(x) = e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) - m = \frac{f(x)}{x} - m$
	0,25		ب - $h'_m(x) = 0$ تكافئ $f(x) = mx$ و $x \neq 0$ إذا كان $m \in ]0; 1[$ فإن المعادلة $h'_m(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]-\infty; 0[$ . إذا كان $m \in ]-\infty; 0[ \cup ]1; +\infty[$ فإن المعادلة $h'_m(x) = 0$ لا تقبل حلا.

ملاحظة: تقبل وتراعى جميع الطرق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط.